

INFORMATIONS INTERNES

Date de l'intervention :

Heure d'admission :

Lieu :

Préparation de l'intestin pour la coloscopie avec MoviPrep

La coloscopie est une intervention médicale courante, en général sans danger et sans douleur, utilisée pour examiner le côlon. Il existe des démarches que vous, le patient, devez suivre avant l'intervention afin de garantir une efficacité et une innocuité supérieures.

- 1 Organisez-vous pour trouver quelqu'un pour vous ramener chez vous après l'intervention.
 - La coloscopie implique la sédation, et vous ne serez donc pas autorisé à partir sans être accompagné.
- 2 Suivez les consignes données par votre médecin relatives aux médicaments à éviter et le régime alimentaire à suivre avant l'intervention.
- 3 Suivez le régime destiné à la préparation de l'intestin intégralement en respectant les instructions décrites à la page suivante.



MoviPrep est vendu dans presque toutes les pharmacies. Si MoviPrep n'est pas vendu dans votre pharmacie, il est possible de le commander et de le recevoir dans un délai de 24 heures.

Information pour votre pharmacien : NDC 65649-201-75

MoviPrep
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

**Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.**

Instructions pour le patient


La boîte MoviPrep contient 4 sachets et un récipient jetable pour effectuer le mélange. Vous devez compléter toute la préparation pour garantir un bon nettoyage.

Début à :

ÉTAPE 1


- Videz un sachet A et un sachet B dans le récipient jetable.
- Ajoutez de l'eau potable tiède jusqu'à la ligne supérieure du récipient. Mélangez pour dissoudre.

Si vous préférez, mélangez la solution à l'avance et mettez-la au réfrigérateur avant de la boire. La solution reconstituée doit être utilisée dans les 24 heures.



ÉTAPE 2

- Le récipient MoviPrep est marqué de 4 repères. Toutes les 15 minutes, buvez la solution jusqu'au repère suivant (environ 250 ml), jusqu'à ce que le litre soit terminé.
- Buvez 500 ml de liquide clair de votre choix.



Début à :

- Répétez les étapes 1 et 2.

Si vous avez des questions, veuillez nous téléphoner au _____.

MoviPrep est indiqué pour le nettoyage du côlon en tant que préparation à la coloscopie chez les adultes âgés de 18 ans ou plus. MoviPrep est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité grave à l'un de ses composants. MoviPrep doit être utilisé avec précaution chez les patients utilisant des médicaments concomitants qui augmentent le risque d'anomalies électrolytiques, chez les patients présentant une hyponatrémie connue ou suspectée, une colite ulcéreuse aiguë, une occlusion intestinale, une occlusion ou une perforation gastro-intestinale, une rétention gastrique, une colite toxique, un mégacôlon toxique ou une carence en glucose 6-phosphate déshydrogénase. Dans les essais cliniques, les effets secondaires les plus courants en réaction à l'administration de MoviPrep étaient une distension abdominale, une gêne anale, une sensation de soif, des nausées et des douleurs abdominales.

MoviPrep contient 2,33 mg maximum de phénylalanine par traitement.

Veuillez consulter les informations posologiques complètes ci-jointes pour MoviPrep.



Site Web : www.salix.com 1700 Perimeter Park Drive, Morrisville, NC 27560 (États-Unis) Tél. • +1 866.669.SLXP (7597)
©2007 Salix Pharmaceuticals, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. MOV 07/19

MoviPrep[®]
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.