

## تجهيز الأمعاء للفحص بمنظار القولون باستخدام MoviPrep

فحص القولون بالمنظار عملية روتينية وأمنة بوجه عام وخالية من الألم، وتستخدم لفحص القولون. هناك خطوات يجب على المريض القيام بها قبل العملية لضمان أعلى مستوى من الأمان والفعالية.



① قم بعمل الترتيبات اللازمة بحيث يأخذك شخص ما في سيارته إلى منزلك بعد العملية

■ عملية فحص القولون بالمنظار تتضمن إعطاءك مادة مهدئة، ولن يسمح لك بترك المستشفى بدون مرافق

② اتبع إرشادات الطبيب فيما يتعلق بالأدوية التي ينبغي تجنبها والنظام الغذائي الواجب اتباعه قبل إجراء العملية

③ قم بإنهاء نظام تجهيز الأمعاء كما هو موضح في الصفحة التالية

**MoviPrep®**  
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.  
High-Volume Efficacy.


MoviPrep متوفر في معظم صيدليات البيع بالتجزئة. إذا كانت صيدليتك ليس بها MoviPrep فإنه يمكن طلبه وتسليمه خلال 24 ساعة.

معلومات للصيديلي: NDC 65649-201-75

# تعليمات للمرضى

تحتوي كرتونة MoviPrep على 4 عبوات وإناء مزج يستخدم مرة واحدة. يجب استكمال عملية التجهيز بالكامل لضمان أقصى فعالية للتنظيف.

بدءاً من:




■ قم بتفريغ عبوة واحدة من المجموعة A وعبوة واحدة من المجموعة B في إناء المزج الذي يستخدم مرة واحدة

■ أضف ماء الشرب الفاتر حتى أعلى الخط الموجود على الإناء. امزج العبوتين حتى الذوبان

امزج المحلول قبل الوقت المحدد وضعه في الثلاجة قبل شربه. إذا كنت تفضل ذلك، يجب استخدام المحلول المركب خلال 24 ساعة

الخطوة 1



■ إناء موفبيرب مقسم بـ 4 علامات. كل 15 دقيقة، اشرب المحلول حتى العلامة التالية (حوالي 8 أونس). حتى تشرب اللتر بالكامل

■ اشرب 16 أونس من السائل الصافي الذي تختاره

الخطوة 2

بدءاً من:

■ كرر الخطوتين 1 و 2

إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى الاتصال بمكتبنا على \_\_\_\_\_.

يوصف MoviPrep لتطهير القولون استعداداً لإجراء عمليات المنظار القولوني للكبار من سن الثامنة عشرة فأكثر. ينصح بعدم استخدام MoviPrep مع المرضى الذين لديهم رد فعل شديد الحساسية لأي من مكوناته، ويجب توخي الحذر في استخدام MoviPrep مع المرضى المصابين بالتهاب القولون المتقرح، أو الانسداد المعوي، أو اعتراض أو ثقب معدي معوي، أو الاحتباس المعوي، أو الالتهابات القولونية السامة، أو القولون المتضخم السام. يجب استخدام MoviPrep بحذر مع المرضى الذين يستخدمون علاجات مصاحبة تزيد من احتمالات حدوث عدم الانتظام في التحليل الكهربائي، أو التهاب القولون المتقرح، أو الانسداد المعوي، أو اعتراض أو ثقب معدي معوي، أو الاحتباس المعوي، أو الالتهابات القولونية السامة، أو القولون المتضخم السام، أو نقص خميرة جلوكوز-6 فوسفات النازعة للهيروجين. في التجارب الكلينية، كان تضخم البطن والمتاعب الشرجية والعطش والغثيان وآلام البطن أكثر ردد الفعل المعاكسة شيوعاً بالنسبة لتعاطي MoviPrep.

يحتوي MoviPrep على الفيனால்انين - 2.33 ملجم من الفيனால்انين كحد أقصى للمعالجة.

يرجى الاطلاع على نشرة MoviPrep المرفقة بالكامل.

## MoviPrep®

(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

الموقع الإلكتروني 866-669-SLXP (7597) هاتف • 1700 Perimeter Drive, Morrisville, NC 27560 www.salix.com  
© حقوق الطبع والنشر 2008 لـ Salix Pharmaceuticals, Inc. جميع الحقوق محفوظة. طبع في الولايات المتحدة الأمريكية MOV 07/23

Salix®  
PHARMACEUTICALS, INC.  
A Division of Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Low-Volume Prep.  
High-Volume Efficacy.