

تاریخ عمل:

زمان رسیدن:

محل:

## آماده سازی روده برای کولونوسکپی با MoviPrep

کولونوسکپی یک عمل عادی، نسبتاً بی خطر، و بدون درد است که از طریق آن روده را معاینه می کنند. گام‌هایی وجود دارند، که شما بعنوان بیمار باید قبل از عمل بردارید تا اطمینان حاصل کنید که این عمل تا حد امکان بی خطر و مؤثر باشد.



- 1 ترتیبی دهید که یکنفر بعد از عمل با اتومبیل شما را به منزل برساند  
 ■ کولونوسکپی مستلزم بیهوشی است، و شما اجازه نخواهید داشت بیمارستان را به تنهایی ترک کنید
- 2 قبل از عمل خود، از دستورات پزشکتان در مورد داروهایی که باید از آنها احتراز کنید و رژیم‌هایی که باید دنبال کنید پیروی نمایید
- 3 تمامی دستوراتالعمل‌های پرهیز غذایی برای آمادگی دفع مدفوع که در صفحه بعد آمده را انجام دهید

**MoviPrep®**  
 (PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,  
 Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.  
 High-Volume Efficacy.


**MoviPrep** در بیشتر داروخانه‌های خرده‌فروشی موجود است. اگر داروخانه شما **MoviPrep** را در انبار ندارد، این دارو را می‌توان در عرض 24 ساعت سفارش داد و تحویل گرفت.

اطلاعات برای داروساز شما: NDC 65649-201-75

# راهنمائي هاي مربوط به بیمار

بسته MoviPrep حاوي 4 پاکت و يك ظرف یکبار مصرف مخلوط کردن است. براي حصول اطمینان از موثرترین پاکسازي شما باید تمامی مراحل آماده سازی را تکمیل کنید.


## ساعت شروع:



- 1 پاکت A و 1 پاکت B را در ظرف یکبار مصرف خالي کنید
- در ظرف آنقدر آب ولرم اضافه کنید تا به خط بالائي آن برسد. مواد را هم بزنید تا حل شود

گام 1

در صورت ترجیح، محلول را از قبل آماده ساخته و پیش از نوشیدن در یخچال بگذارید. محلول بدست آمده باید در عرض 24 ساعت مصرف شود.



- ظرف MoviPrep به 4 قسمت علامت دار تقسیم شده است. هر 15 دقیقه، آنقدر محلول را بنوشید تا به علامت بعدی برسد (تقریباً 8 اونس). تا تمامی يك لیتر مصرف شود

گام 2

- 16 اونس مایع شفاف انتخابی خود را بنوشید

## ساعت شروع:

- گامهاي 1 و 2 را تکرار کنید

اگر سؤالي دارید، لطفاً با دفتر ما به شماره \_\_\_\_\_ تماس بگیرید.

MoviPrep براي تمیز کردن کولون و بعنوان يك مقدمه براي کولونوسکپی در افراد بالغ 18 ساله یا بالاتر در نظر گرفته شده است. MoviPrep به بیماراني که نسبت به هر کدام از اجزاء آن آلرژی یا حساسیت بیش از حد دارند توصیه نمی شود. MoviPrep در رابطه با بیماراني که داروهاي همراهی را مصرف می کنند که ریسک موارد مربوط به الکترولیت را افزایش می دهد، در بیماراني که مشخص شده یا ظن می رود که دارای هایپرناترمیا، زخم یا آماس روده شدید، انسداد روده، گرفتگی یا زخم معده و روده، نفخ شکم، ورم روده سمی، مگا کولون سمی، یا نارسائی glucose-6-phosphate dehydrogenase هستند با احتیاط باید مصرف شود. در آزمایشات کلینیکی، نفخ شکم، ناراحتی مقعد، تشنگی، سرگیجه، و شکم درد معمول ترین واکنش هاي منفي نسبت به تجویز MoviPrep بودند.

MoviPrep حاوي حداکثر 2.33 mg فنیل آلانین در هر مصرف درمانی است.

لطفاً اطلاعات کامل جوف در رابطه با تجویز MoviPrep را ملاحظه کنید.

# MoviPrep®

(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

تاریخچه: Salix Pharmaceuticals, Inc. ایالات متحده آمریکا 1700 Perimeter Park Drive, Morrisville, NC 27560 • تلفن: 866.669.SLXP (7597) • تمام حقوق محفوظ است. ©2008 Salix Pharmaceuticals, Inc. چاپ آمریکا. MOVI 08/01

Salix  
PHARMACEUTICALS, INC.  
A wholly owned subsidiary of

Low-Volume Prep.  
High-Volume Efficacy.