

사무실 정보

시술 날짜:

도착 시간:

위치:

MoviPrep을 이용한 결장내시경검사를 위한 장 준비

결장내시경검사는 결장을 검사하기 위해 사용되는 일상적인 시술로서, 일반적으로 안전하며, 통증이 없는 시술입니다. 최상의 안전과 효과를 위해 시술 전 환자가 취해야 할 조치가 있습니다.

- ① 시술 후 누군가가 환자 자신을 집에 태워다 주도록 조치하십시오.
 - 결장내시경검사에는 진정이 수반되며, 동반자 없이 혼자서 떠나는 것은 허락되지 않을 것입니다.
- ② 금해야 할 약과 시술 전 따라야 할 식사에 대한 의사의 지시에 따르십시오.
- ③ 다음 페이지에 기술한 대로 전체 장 준비 요법을 끝내십시오.



MoviPrep은 대부분의 소매 약국에서 구입할 수 있습니다. 약국에 MoviPrep이 없을 경우, 24시간 이내에 주문 배달이 가능합니다.

약사 정보: NDC 65649-201-75

MoviPrep
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.

환자 지시사항


MoviPrep 카톤 용기에는 파우치 4개와 혼합을 위한 일회용 용기가 들어 있습니다. 가장 효과적인 청소를 위해 전체 준비를 완수해야 합니다.

시작:

1 단계


- 파우치 A 1개와 파우치 B 1개를 일회용 용기에 부으십시오
- 미지근한 식수를 용기의 상단 선까지 첨가하십시오. 섞어서 용해시키십시오

경우에 따라 용액을 미리 섞어서 마시기 전에 냉장시키십시오. 조제된 용액은 24시간 이내에 사용해야 합니다.



2 단계

- MoviPrep 용기는 4개의 표시로 나누어져 있습니다. 1리터를 다 마실 때까지 15분마다 용액을 다음 표시(약 8온스)까지 마십시오
- 선택한 맑은 수액 16온스를 마십시오



시작:

- 단계 및 2단계를 반복하십시오

문의 사항이 있으면, _____ 번으로 우리 사무실로 연락하십시오.

MoviPrep은 18세 이상 성인을 대상으로 결장내시경검사를 위한 준비 과정인 결장 청소에 필요합니다. MoviPrep은 그 성분 중 어느 것에든지 그에 심한 과민 반응이 있는 환자에서는 금기입니다. 전해질 이상 위험을 증가시키는 부수 약물을 사용하는 환자나 저나트륨혈증이 알려졌거나 의심되는 환자, 또는 심한 궤양성결장염, 장폐색, 위장관 막힘이나 천공, 위축적, 독성 결장염, 독성 큰결장증 및 글루코오스-6-인산탈수소효소 결핍 환자에서는 주의해서 MoviPrep 사용해야 합니다. 임상 시험에서 MoviPrep 투여에 대한 가장 일반적인 부작용은 복부팽만, 항문 문제, 갈증, 구역 및 복통이었습니다.

MoviPrep에는 치료 당 최대 2.33mg의 페닐알라닌이 함유되어 있습니다.

첨부한 완전한 MoviPrep 처방 정보를 참조하십시오.

Salix Pharmaceuticals, Inc. 웹사이트: www.salix.com 1700 Perimeter Park Drive, Morrisville, NC 27560 전화 • 866.669.SLXP (7597)
©2007 Salix Pharmaceuticals, Inc. 제반 권리는 당사가 보유합니다. 미국에서 인쇄 MOV 06/26

MoviPrep[®]
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.