

INFORMACIÓN DEL CONSULTORIO

Fecha del procedimiento:

Hora de llegada:

Lugar:

Preparación intestinal para colonoscopia con MoviPrep

La colonoscopia es un procedimiento de rutina, generalmente seguro, que se utiliza para examinar el colon. Usted, el paciente, debe seguir algunos pasos antes del procedimiento, a fin de garantizar el mayor nivel de seguridad y efectividad.

- 1 Pídale a una persona que le lleve a su hogar después del procedimiento
 - La colonoscopia requiere el uso de sedantes, y no se le permitirá retirarse del hospital si no está acompañado por otra persona
- 2 Siga las instrucciones de su médico con respecto a los medicamentos que debe evitar y la dieta que debe seguir antes del procedimiento
- 3 Termine todo el régimen de preparación intestinal, tal como se describe en la página siguiente



MoviPrep está disponible en la mayoría de las farmacias minoristas. Si su farmacia no tiene MoviPrep en inventario, puede pedirlo y recibirlo en un plazo de 24 horas.

Información para su farmacéutico: NDC 65649-201-75

MoviPrep[®]
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)
Rx only
Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.

CONSIDERACIONES SOBRE LA SEGURIDAD

MoviPrep[®] (PEG-3350, sulfato de sodio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, ascorbato de sodio y ácido ascórbico para solución oral) está indicado para la limpieza del colon, como preparación para la colonoscopia en adultos de 18 años o mayores. MoviPrep está contraindicado en pacientes que han presentado una reacción grave de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. MoviPrep deberá ser utilizado con precaución en pacientes a los que se administran medicamentos concomitantes que aumenten el riesgo de anomalías electrolíticas, en pacientes con hiponatremia conocida o presunta, colitis ulcerosa grave, íleo, obstrucción o perforación gastrointestinal, retención gástrica, colitis tóxica, megacolon tóxico o deficiencia de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. En ensayos clínicos, las reacciones adversas más comunes observadas con la administración de MoviPrep fueron distensión abdominal, molestia anal, sed, náuseas y dolor abdominal. MoviPrep contiene un máximo de 2.33 mg de fenilalanina por tratamiento.

Lea todo el prospecto adjunto para MoviPrep.


Instrucciones para el paciente

La caja de MoviPrep contiene 4 bolsas y un recipiente desechable para mezclar el producto. Debe completar toda la preparación para garantizar una limpieza más efectiva.

Inicio a las: _____


PASO 1 MEZCLE LA PRIMERA DOSIS

- Vacíe 1 bolsa A y 1 bolsa B en el recipiente desechable
 - Agregue agua potable tibia hasta la línea superior del recipiente. Mezcle hasta disolver
- Si lo prefiere, prepare la solución por anticipado y refrigérela antes de beber. La solución reconstituida debe utilizarse en un plazo de 24 horas.**



PASO 2 BEBA LA PRIMERA DOSIS

- El recipiente de MoviPrep tiene 4 marcas divisorias. Cada 15 minutos, beba la solución hasta la marca siguiente (aproximadamente 8 oz), hasta consumir todo el litro
- Beba 16 oz del líquido claro de su preferencia. Este es un paso necesario para asegurar una hidratación adecuada y una preparación eficaz




Los líquidos claros incluyen agua, ginger ale, jugo de manzana, Gatorade, limonada y caldo. No incluyen líquidos rojos ni morados.**

Consulte a su médico si usted tiene alguna pregunta acerca de si una bebida en particular es aceptable.

Inicio a las: _____


PASO 3 MEZCLE LA SEGUNDA DOSIS

- Vacíe 1 bolsa A y 1 bolsa B en el recipiente desechable
 - Agregue agua potable tibia hasta la línea superior del recipiente. Mezcle hasta disolver
- Si lo prefiere, prepare la solución por anticipado y refrigérela antes de beber. La solución reconstituida debe utilizarse en un plazo de 24 horas.**



PASO 4 BEBA LA SEGUNDA DOSIS

- El recipiente de MoviPrep tiene 4 marcas divisorias. Cada 15 minutos, beba la solución hasta la marca siguiente (aproximadamente 8 oz), hasta consumir todo el litro
- Beba 16 oz del líquido claro de su preferencia. Este es un paso necesario para asegurar una hidratación adecuada y una preparación eficaz



Una preparación para colonoscopia hace que el cuerpo pierda una cantidad significativa de líquido y puede ocasionar una enfermedad debido a deshidratación. Es importante que usted prepare el cuerpo bebiendo cantidades adicionales de líquidos claros antes de la preparación. Manténgase hidratado bebiendo todos los líquidos claros requeridos durante la preparación. Reponga su sistema bebiendo líquidos claros al regresar a su hogar después de la colonoscopia.

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro consultorio al _____.

*Gatorade es una marca comercial registrada de Stokely-Van Camp, Inc, Chicago, IL.

MoviPrep[®]
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Rx only

**Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.**

Spanish