

辦公室資訊

檢查日期：

抵達時間：

地點：

使用 Moviprep 為大腸鏡檢查進行腸道準備

大腸鏡檢查是一項用於檢查大腸的常規、通常安全、無痛的程序。身為患者，您必須在進行檢查前採取一些步驟來確保獲得最高等級的安全性和效果。

- 1 安排某人在檢查後開車送您回家
 - 大腸鏡檢查會使用鎮靜劑，因此不允許您一個人離開診所
- 2 遵循您的醫生有關檢查前應避免哪些藥物及如何飲食的指示
- 3 依下頁所述，完成全部腸道準備



Moviprep 在大多數零售藥局有售。
如果您的藥局沒有 Moviprep 庫存，
您可以訂購且會 24 小時內到貨。

您的藥劑師資訊: NDC 65649-201-75

Moviprep
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.

患者指示


MoviPrep 藥盒裝有 4 個小袋和一個供混合用的一次性容器。
您必須完成全部準備工作以確保最有效地清潔腸道。

開始:

第 1 步


- 將 1 個 A 袋和 1 個 B 袋完全倒入可棄式容器
- 加入溫水，直到容器最上方的刻度。混合至溶解

如果喜歡，可以提前混合溶液且在飲用前冷藏。
復原的溶液應當在 24 小時內使用。



第 2 步

- MoviPrep 容器分為 4 個刻度。每 15 分鐘飲用溶液至下一個刻度(大約 8 盎司)，直到喝完一升溶液
- 飲用 16 盎司您選擇的清液



開始:

- 重複步驟 1 和 2

如果您有任何問題，請致電我們的辦公室，電話: _____。

MoviPrep 適用於清潔 18 歲或以上成年人的大腸，以作為大腸鏡檢查的準備工作。MoviPrep 禁用於曾對其任何成份發生嚴重過敏反應的患者。MoviPrep 應慎用於下列患者：同時使用增加電解質異常風險的藥物的患者、已知或懷疑低鈉血症、嚴重潰瘍性大腸炎、腸梗阻、胃腸道梗阻或穿孔、胃滯留、中毒性大腸炎、中毒性巨結腸，或葡萄糖 -6- 磷酸酵素缺乏症患者。在臨床試驗中，服用 MoviPrep 的最常見副作用是腹脹、肛門不適、口渴、噁心和腹痛。

每次治療所用的 MoviPrep 含有最多 2.33 毫克苯丙氨酸。

請參閱隨附的 MoviPrep 完整處方資訊。



網站: www.salix.com 1700 Perimeter Park Drive, Morrisville, NC 27560 電話 • 866.669.SLXP (7597)
© 2007 Salix Pharmaceuticals, Inc. 版權所有。 保留所有權利。 在美國印刷。 MOV 06/25

MoviPrep[®]
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.